

Вакцинация - надежная мера профилактики инфекционных заболеваний.



Право на охрану здоровья регламентируется Конституцией Республики Беларусь, статья 45 «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания».


Каждый гражданин Республики Беларусь обязан принимать меры по сохранению и укреплению здоровья. Государство предоставляет каждому возможность защититься от инфекционных заболеваний, в том числе с помощью вакцинации.

Справочно: вакцины – лекарственные средства (Закон «О Лекарственных средствах»), предназначенные для профилактики инфекционных заболеваний, относятся к группе иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП).

Вакцинация населения Республики Беларусь осуществляется в рамках оказания медицинской помощи гражданам. Услуга «вакцинация» входит в стандарт оказания медицинской амбулаторно-поликлинической помощи населению и осуществляется бесплатно в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (далее – Национальный календарь), утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 №42 «О профилактических прививках» с изменениями и дополнениями.



КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



ВГВ	вакцина против вирусного гепатита В
БЦЖ-М	вакцина против туберкулеза
КДС	вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка
ИПВ	вакцина против полиомиелита
ХИБ	вакцина против гемофильной инфекции
ПКИ	вакцина против пневмококковой инфекции
КПК	вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи
АД-М	вакцина против дифтерии
АДС-М	вакцина против дифтерии, столбняка
ВПЧ	вакцина против папилломавирусной инфекции

**Информация о вакцинации в рамках Национального календаря
за счет средств республиканского бюджета и на платной основе**

Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок	ИЛП, закупаемые за счет республиканского средств бюджета	Перечень возможных иммунобиологических препаратов для вакцинации за счет личных средств граждан (при их наличии)
Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 ч жизни	Вакцина против вирусного гепатита В: Эувакс В для детей	-
	Дети в возрасте 2, 3, 4, месяцев	5-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АцКДС+Хиб+ВГВ) 6-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АбКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ)	6-ти компонентные вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АаКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ): Гексаксим, Инфанрикс Гекса
Туберкулез	Новорожденные на 3-5-й день жизни	Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации БЦЖ-М	-

Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев из группы риска*	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная десятивалентная Синфлорикс Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13	-
Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция, полиомиелит	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев	5-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АцКДС+Хиб+ВГВ); Вакцина для профилактики полиомиелита Имовакс Полио (ИПВ); 6-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АбКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ)	6-ти компонентные вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b (АбКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ): Гексаксим, Инфанрикс Гекса
Гемофильная инфекция	Дети в возрасте до 5 лет из группы риска, ранее не получившие прививки	Конъюгированная вакцина для профилактики инфекций, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b: АКТ-ХИБ, Хиберикс.	-

Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 18 месяцев	Вакцина коклюшно-дифтерийно- столбнячная (АцКДС): АКДС Вакцина дифтерийно-столбнячная рехкомпонентная бесклеточная ткоклюшная (АаКДС): Инфанрикс	Вакцина дифтерийно- столбнячная трехкомпонентная бесклеточная коклюшная (АаКДС): Инфанрикс
Полиомиелит	Дети в возрасте 7 лет	Вакцина для профилактики полиомиелита Имовакс Полио (ИПВ)	-
Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет	Комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи: Приорикс	-
Дифтерия, столбняк	Дети в возрасте 6, 16 лет	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов АДС-М	Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточная) (АаКДС-М): Адасель
	Взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов АДС-М	Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и

			коклюша (бесклеточная) (АаКДС): Адасель
Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена: АД-М-анатоксин	-
Грипп	Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями. Лица с иммуносупрессией. Лица в возрасте старше 65 лет. Беременные женщины. Медицинские, фармацевтические работники. Дети и взрослые, находящиеся с круглосуточным режимом пребывания. Работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.	Вакцины для профилактики гриппа инаktivированные (3-компонентные): Гриппол Плюс, пр. РФ Вакцина для профилактики гриппа инаktivированная (ВПИ)	Вакцины для профилактики гриппа инаktivированные (3- 4-компонентные): Гриппол Плюс, ИнфлювакТетра, ВаксигрипТетра

Дифтерия. столбняк, коклюш, полиомиелит	Дети в возрасте от 2 месяцев до 14 лет по индивидуальному плану	-	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная (АаКДС+ИПВ): Тетраксим
Дифтерия, столбняк	Дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет по индивидуальному плану	Анатоксин дифтерийно-столбнячный: АДС-анатоксин	-

В Республике Беларусь регламентировано проведение профилактических прививок **по эпидемическим показаниям против 19 инфекций** отдельным профессиональным группам; лицам, проживающим на территории с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми инфекциями; контактным в очагах инфекций; при выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке.

Вакцинации против COVID-19 ежегодно в сентябре – декабре подлежат:
дети в возрасте от 5–17 лет:

- с хроническими заболеваниями;
- с иммуносупрессией;
- находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
- лица в возрасте 18 лет и старше:
- с хроническими заболеваниями;
- с иммуносупрессией;
- в возрасте старше 60 лет;
- находящиеся и работающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
- медицинские и фармацевтические работники; беременные женщины; иные лица при обращении.

Информация о профилактических прививках в рамках Перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок
Бешенство	Взрослые из числа «профессиональных групп риска». Лица, имеющие медицинские показания к иммунизации по причине контакта с животными.
Вирусный гепатит А	Лица, находящиеся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз: вирусный гепатит А
Вирусный гепатит В	Дети и взрослые, получающие медицинскую помощь с использованием крови и (или) ее компонентов, а также находящиеся на гемодиализе, с онкогематологическими заболеваниями. Лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита В. Работники здравоохранения, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека. Лица, занятые в производстве ИЛП из донорской и плацентарной крови. Обучающиеся в учреждениях образования по профилю «Здравоохранение»
Клещевой энцефалит	Работники лесохозяйственных организаций, выполняющие работы на территориях национального парка «Беловежская пуща», Березинского биосферного заповедника и других энзоотичных территориях
Желтая лихорадка	Лица, выезжающие за рубеж в эндемичные по желтой лихорадке страны

Корь	Взрослые и дети, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «корь», не болевшие корью и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против кори или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против кори
Столбняк	Лица, имеющие медицинские показания к экстренной специфической профилактике столбняка
Инфекция COVID-19	<u>дети в возрасте от 5–17 лет:</u> с хроническими заболеваниями; с иммуносупрессией; находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; <u>лица в возрасте 18 лет и старше:</u> с хроническими заболеваниями; с иммуносупрессией; в возрасте старше 60 лет; находящиеся и работающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; медицинские и фармацевтические работники; беременные женщины; иные лица при обращении
Бруцеллез	Работники животноводческих комплексов (ферм) – до полной ликвидации в хозяйствах животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего вида Работники организаций по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства – до полной ликвидации животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего типа, в хозяйствах, из которых поступит скот, сырье и продукты животноводства Работники бактериологических лабораторий, работающие с живыми культурами бруцелл, а также с материалом, инфицированным возбудителем бруцеллеза

	Работники организаций по убою скота, больного бруцеллезом козье- овечьего типа, заготовке и переработке полученных от него животноводческих продуктов Животноводы, зооветработники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу козье-овечьего типа, занятые непосредственным обслуживанием животных
Лептоспироз	Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства и птицеводства, полученных из неблагополучных по лептоспирозу хозяйств либо хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза
Сибирская язва	Лица, выполняющие следующие работы на территории неблагополучных пунктов по сибирской язве: работы, связанные с выемкой и перемещением грунта (ликвидация аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, благоустройство сибиреязвенных захоронений, отбор проб почвы для исследования на наличие возбудителей сибирской язвы); по убою скота, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов; по сбору, хранению и первичной переработке сырья животного происхождения (в том числе в кожевенном производстве) Животноводы, ветеринарные работники и зоотехники, занятые непосредственным обслуживанием животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя сибирской язвы, с зараженными сибирской язвой лабораторными животными или исследующие материал, инфицированный возбудителем сибирской язвы
Чума	Лица, выезжающие на энзоотичные по чуме территории
Туляремия	Лица, проживающие на территории активных природных очагов туляремии, а также прибывшие на эти территории и выполняющие следующие работы:

	сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, по отлову грызунов и кровососущих насекомых Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии
Дифтерия	Контактные лица в очагах инфекции: лица, не привитые против дифтерии; дети, у которых настал срок очередной профилактической прививки; взрослые, у которых согласно медицинским документам от последней профилактической прививки против дифтерии прошло 5 и более лет; лица, у которых при серологическом обследовании противодифтерийные антитела выявлены в титре менее 1:40 (0,01 МЕ/мл)
Коклюш	Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «коклюш» в очагах коклюшной инфекции, не болевшие коклюшем и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против коклюша или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против коклюша
Краснуха	Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «краснуха» в очагах краснушной инфекции, не болевшие краснухой и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против краснухи или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против краснухи
Ветряная оспа	Дети, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, при отсутствии антител или через 2 года после окончания иммуносупрессивной терапии после проведения такой трансплантации
Полиомиелит	Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «полиомиелит», не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против полиомиелита или

	лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита, в очаге полиомиелитной инфекции Лица, не привитые против полиомиелита, прибывшие из эпидемически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие в эпидемически
Эпидемический паротит	Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «эпидемический паротит» (несовершеннолетние) в очагах эпидемического паротита, ранее не болевшие эпидемическим паротитом, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против эпидемического паротита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против эпидемического паротита

**прививки против желтой лихорадки проводятся по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119, УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска». Информация о порядке проведения размещена на сайте данного учреждения (<https://19crp>)*

Медицинские услуги **сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи** являются дополнительными, в том числе вакцинация, и оказываются учреждениями здравоохранения на платной основе в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Для оказания **платных услуг населению по вакцинации** в Гродненской области реализуется **до 21 наименования различных вакцин против 13-ти инфекционных заболеваний**, в том числе в различных комбинациях против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В, полиомиелита, Хиб-инфекции; клещевого энцефалита; пневмококковой; менингококковой; ротавирусной; папилломавирусной инфекций; ветряной оспы; вирусного гепатита А.

Перечень инфекций, против которых могут проводиться профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам	вакцины, предоставляемые за счет личных средств граждан	Схемы проведения профилактических прививок
Вирусный гепатит В	Взрослые	Эувакс В для взрослых	по схеме 0 – 1 – 6
Вирусный гепатит А	Взрослые и дети	Хаврикс	по схеме 0 – 6

Клещевой энцефалит	Дети в возрасте от 12 месяцев до 16 лет	Клещ-Э-ВАК (доза 0,25 мл)	Вакцинация: две прививки с интервалом от 2 недель до 7 месяцев (предпочтительно 2 месяца) Первая бустерная доза: через 12 месяцев от второй вакцинации Последующие бустерные дозы: каждые 3 года
	Дети с 16 лет и старше	Клещ-Э-ВАК, (доза 0,5 мл)	Вакцинация: две прививки с интервалом от 2 недель до 7 месяцев (предпочтительно 2 месяца) Первая бустерная доза: через 12 месяцев от второй вакцинации Последующие бустерные дозы: каждые 3 года
	Взрослые с 18 лет и старше	Энцевир (доза 0,5 мл)	Вакцинация: две прививки с интервалом от 2 недель до 7 месяцев (предпочтительно 2 месяца) Первая бустерная доза: через 12 месяцев от второй вакцинации Последующие бустерные дозы: каждые 3 года
		Клещ-Э-ВАК (доза 0,5 мл)	Вакцинация: две прививки с интервалом 2 недели или 1

			месяц или допускается до 7 месяцев (предпочтительно 2 месяца) Первая бустерная доза: через 12 месяцев от второй вакцинации Последующие бустерные дозы: каждые 3 года
Менингококковая инфекция	Дети в возрасте от 6 недель до 6 месяцев	Вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y: Нименрикс	Первичная вакцинация: две дозы с интервалом 2 месяца Бустерная доза: однократно (не ранее 2 месяцев после второй вакцинации, предпочтительно в возрасте 12 месяцев)
	Дети в возрасте от 9-ти месяцев до 2-х лет	Вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y: Менактра	2-кратно с интервалом 3 месяца
	Дети в возрасте от 2-х лет, подростки и взрослые	Вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y: Менактра	однократно при сохраняющихся рисках заболевания предусматривается бустеризация с 15-ти лет
Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте от 6 недель до 12 месяцев	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная	по схеме в соответствии с официальными документами

	десятивалентная Синфлорикс Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13	
Дети в возрасте от 12 месяцев до 2-х лет	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная десятивалентная Синфлорикс Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13	2-кратно с минимальным интервалом 2 месяца
Дети в возрасте 2 - 5 лет	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная десятивалентная Синфлорикс	2-кратно с минимальным интервалом 2 месяца

	Дети с 2-лет, подростки и взрослые	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13	однократно
Папилломавирусная инфекция	Лица в возрасте от 9 до 14 лет Лица в возрасте от 14 до 45 лет	Гардасил (типов 6, 11, 16, 18)	по схеме 0 – 6 по схеме 0 – 2 – 6
	Лица в возрасте от 9 до 15 лет Лица в возрасте от 15 до 45 лет	Церварикс (типов 16, 18)	по схеме 0 – 6 по схеме 0 – 1 – 6
Ветряная оспа	Дети в возрасте от 9 – ти месяцев, подростки и взрослые	Варилрикс	2-кратно с минимальным интервалом 6 недель
	Дети в возрасте от 12 – ти месяцев до 12 лет	Варицелла	однократно
Ротавирусная инфекция	Дети в возрасте от 6 до 32 недель	Рота-V-Эйд	3-кратно с минимальный интервалом 4 недели
Вакцины с различными комбинациями против дифтерии, столбняка, коклюша,	Дети в возрасте от 6 недель до 2-х лет	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита, гепатита В и	по схеме в соответствии с официальными документами

полиомиелита, вирусного гепатита В, Хиб-инфекции		инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b Гексаксим	
	Дети в возрасте от 6 недель до 3 лет	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b Инфанрикс Гекса	по схеме в соответствии с официальными документами
	Дети в возрасте от 6 недель до 13 лет включительно	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита, Тетраксим	по схеме в соответствии с официальными документами
	Дети в возрасте от 6 недель до 7 лет	Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), Инфанрикс	по схеме в соответствии с официальными документами
	Дети в возрасте от 4 лет, подростки, взрослые	Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная) Адасель	по схеме в соответствии с официальными документами

По желанию граждан вакцинацию за **счет собственных средств** можно выполнить в учреждении здравоохранения «Зельвенская центральная районная больница» как в районной поликлинике, так и в сельской амбулатории.

Получить актуальную информацию в отношении порядка проведения вакцинации, наличия и стоимости интересующих вакцин рекомендуется у участкового врача-терапевта или педиатра лично на приеме или по телефону, указанном на сайте УЗ «Зельвенская ЦРБ».

В Зельвенском районном ЦГЭ информацию по вопросам вакцинопрофилактики населения района вы можете получить по телефону **80156471717**.

**Помните, что на современном этапе самой надежной защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация.
Прививайтесь и будьте здоровы!**



*Материал подготовила помощник врача-эпидемиолога
санитарно-эпидемиологического отдела
Зельвенского районного ЦГЭ
Валентина Анатольевна Потапович*